



Mezcla Para las Toallas de Esterilización

MEZCLA

- Use 1 cucharada (un tapon) de cloro por cada galón de agua tibia. No use cloro con holores, colores, o aditivos.
- La mezcal deve ser 100 partes por millon (ppm) de cloro. Deve obtener las pruebas de cloro para asegurar que la concentración es apropiada.
- Amonia cuaternario (Quats) es un esterilizante aprobado. Siga las instrucciones de la botella para obtener 200 ppm y use un provador aprobado.

USO

- Marque las cubetas y ponga las en areas de preparación de comida o en otras areas donde sea necesario.
- Toda las toallas tienen que moverse libremente en la solución y en a cubeta. No llene las cubetas con toallas en exeso.
- Las toallas deben mantenerse en la solución entre usos. No deje las toallas en las mesas, por ejemplo.
- Desinfecte todas las superficies de comida entre usos y por lo menos cada 4 horas para evitar la contaminación cruzada.
- No se lave o enjuage las manos en la cubetas de eserilización.

CAMBIO

- Cambie las solución cada vez que la agua este sucia o cuando aya mucha comida o particulares en el agua o sangre de carnes en exeso.
- Siempre cambie la solución cuando el nivel del esterilizante callga abajo de 100 ppm cloro o 200 ppm quats.

NOTAS

- Estas estándares son basadas en las Layas Uniformes de Las Ventas de Comida en California (CURFFL), secciones 114060, 114090, 114160 (d).

